

## LAUBGEHÖLZE:

<b>Acer x conspicuum 'Phoenix'</b> Strauchartiger Wuchs, die Zweige verfärben sich von lachsfarben bis cremegelb im Sommer zu glänzend rot im Winter mit weißen Streifen	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer x conspicuum 'Silver Vein'</b> Baum mit fächerförmiger Krone, blaugraue Rinde mit auffallend silbergrauen Streifen, Blätter glänzend grün, im Herbst dunkelgelb	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Bloodgood'</b> robuster Fächerahorn mit tiefrotem Austrieb, später dunkelrotbrauner Belaubung, Herbstfärbung tief rot bis leuchtend rot	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Deshojo'</b> Austrieb leuchtend rot, Blätter im Sommer grün, roter Nachtrieb Wuchs überhängend und breit mit dünnen Trieben	<b>2j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Fire Glow'</b> samtröte farbbeständige Blätter, die an lichtschwachen Standorten nur wenig Farbe verlieren, Wuchs schwächer und breiter trichterförmig als 'Bloodgood'	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Kamagata'</b> kompakter Wuchs, sonnenverträglich feine frischgrüne Belaubung, die sich im Herbst gelborange verfärbt	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Koto no ito'</b> schmales, sehr feines Bambus ähnliches grünes Laub, Triebe kräftig grün, Herbstlaub in verschiedenen Gelbtönen, Wuchs breit trichterförmig	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Osakazuki'</b> dunkelgrüner Fächerahorn, gelb-orange-rote Herbstfärbung	<b>2j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Red Pygmy'</b> mit Austrieb dunkelrote schmale Blätter, im Sommer grünrot, die sehr schmalen fein gesägten Blätter bilden sich im folgenden Jahr aus, Herbstlaub zinnober bis orangerot, schwachwüchsig	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Sangokaku'</b> aufrechter Wuchs, Rinde im Winter korallenrot	<b>1j.Vg</b> <b>2j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b> <b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Seiryu'</b> aufrechter Wuchs, tief und fein zerschlitztes hellgrünes Blatt, gelbe Herbstfärbung	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Shishigashiri'</b> schmal aufrechter, langsamer Wuchs, nach oben gekräuseltes, sattgrünes Laub	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>
<b>Acer palmatum 'Skeeters Broom'</b> kompakter, schlank aufrechter Wuchs, schwächer im Wuchs als 'Bloodgood', Laub purpurrot, im Sommer mehr braunrot, Herbstfärbung tief rot bis leuchtend rot	<b>1j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Acer platanoides 'Crimson Sentry'</b> mittelhoher, schmalkroniger Wuchs, Blätter mit intensiv purpurroter Färbung	<b>1j.Vg</b>	<b>50- 80</b>	<b>C2</b>
<b>Acer shirasawanum 'Aureum'</b> gelbbelaubte schwachwüchsige Form mit gelben Blättern und roten Blattstielen, Blätter meist 11-lappig, Standort absonnig	<b>1j.Vg</b>		<b>P1</b>

<b>Aesculus x mutabilis 'Penduliflora'</b> strauch- bis baumartiger Wuchs mit etwas hängenden Zweigenden und Blütenrispen, die 10-15 cm lang sind, Kelch rötlich, Petalen gelb	<b>3j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Aesculus pavia 'Koehnei'</b> strauchartige Zwergform, Blüten rot und gelb	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 20</b>	<b>P1</b>
<b>Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'</b> kugelige Zwergform, Blätter ganzjährig blaugrün, sehr winterhart		<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Carpinus betulus 'Monument'</b> kompakt und dichte, langsam wachsende Säulenform	<b>1j.Vg</b> <b>2j.Vg</b>	<b>10- 15</b> <b>20- 30</b>	<b>P1</b> <b>P1</b>
<b>Castanea sativa</b> hoher, breitkroniger Baum, Blätter glänzend dunkelgrün, gelbe Herbstfärbung, stark duftende gelbe Blüten im Mai, Nüsse essbar	<b>2j.</b>		<b>P1</b>
<b>Cercidiphyllum japonicum</b> mehrstämmiger hoher Baum mit regelmäßiger, breit kegelförmiger Krone, Blätter im Austrieb violettrot und im Herbst intensiv hellgelb; winzige, karminrote Blüten vor dem Austrieb	<b>3j.</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Chaenomeles 'Friesdorf'</b> aufrechter Wuchs, hellrote Blüte, zum Schnitt geeignet	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Chaenomeles japonica 'Cido'</b> Dornenlos, bis ca. 1,5m hoch und breit, Blüte orange, große Früchte mit hohem Vitamin C-Gehalt, die aromatisch duften	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Chaenomeles japonica 'Cido Red'</b> rote Blüte, sonst gleiche Eigenschaften wie 'Cido'	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Chaenomeles japonica 'Sargentii'</b> niedriger, dichter Wuchs, zahlreiche lachsrosa bis orange Blüten	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Chaenomeles x superba 'Cameo'</b> apricotfarbene Blüten, Früchte gelbgrün, Wuchs breit aufrecht	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Chaenomeles x superba 'Fusion'</b> niedriger Wuchs, scharlachrote Blüten, reich blühend und fruchtend, Früchte besonders reich an Vitamin C	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Chaenomeles x superba 'Hollandia'</b> Blüte lachsrosa, Wuchs breitbuschig	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Chaenomeles speciosa 'Yukigoten'</b> halb gefüllte grünlich weiße Blüten, kompakt aufrechter Wuchs, hellgrüne Blätter	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Clethra alnifolia 'Hummingbird'</b> kompakter Wuchs, bis ca. 1,2 m hoch werdend, reich blühend,	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Clethra alnifolia 'Ruby Spice'</b> Knospen rötlich, Blüten dunkelrosa, wertvoller Spätblüher im Juli-September, Schmetterlinge und Bienen anziehend	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Clethra fargesii</b> duftende lange weiße Rispenblüten im Juli/August, benötigt weniger feuchte Böden wie Clethra alnifolia	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Cornus controversa</b> Wuchs etagenförmig, Äste waagrecht abstehend, gelbe bis weinrote Herbstfärbung	<b>2j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>

<b>Cornus kousa 'Milky Way'</b> sehr reich blühende weiße Selektion, kräftiger Wuchs	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Cornus kousa 'Satomi'</b> ab Juni purpurrosa Blüten, die in voller Sonne kirschrot werden, leuchtend rote Herbstfärbung	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Cornus nuttallii 'North Star'</b> Großstrauch mit großer weißer Blüte im Mai, leuchtend gelbe bis orangerote Herbstfärbung	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Cornus sanguinea 'Compressa'</b> Zwergform mit stark runzeligen, dunkelgrünen Blättern, die tief sitzende Nerven haben	<b>2j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
<b>Cornus 'Rutgan' (STELLAR PINK)</b> zahlreiche zartrosa Blüten im Mai – Juni, Kreuzung zwischen Cornus florida und Cornus kousa	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Cornus officinalis 'Robin`s Pride'</b> Selektion der japanischen Kornelkirsche mit breit pyramidalem Wuchs hat größere und frühere Blüten als Cornus mas, schon als junge Pflanze reichblühend	<b>2j.Vg</b>	<b>30- 50</b> <b>50- 80</b>	<b>P1</b> <b>C3</b>
<b>Corylus avellana 'Scooter'</b> Zwergstrauch mit kompaktem, kugeligem Wuchs und gedrehten Ästen, Blätter im Austrieb rötlich, sonst grün, bleibt ohne Schnitt kugelig	<b>2j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Corylus colurna</b> Wuchs regelmäßig schmal- bis breitkegelförmig, Stamm grauweiß mit rauher, korkiger Borke	<b>3j.</b>	<b>80-120</b>	<b>P1</b>
<b>Crataegus orientalis</b> tief gelappte graugrüne Blätter, bis zu 15 mm große leuchtend orangerote kugelige Früchte	<b>2j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Enkianthus campanulatus 'Wallaby'</b> schwachwüchsige, kompakte Form der Prachtglocke, bis ca. 1 Meter hoch, rosa Blüte, Herbstfärbung gelborange bis rot	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b>	<b>P0,5</b>
<b>Euonymus alatus</b> Zweige mit korkartigen Flügelleisten, leuchtend dunkelrote Herbstfärbung	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b> <b>20- 30</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Euonymus alatus 'Compactus'</b> Zwergform, flachrund und dicht wachsend, Herbstlaub scharlachrot	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b> <b>20- 30</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Fagus sylvatica 'Black Swan'</b> Wuchs nicht so schmal wie bei 'Purple Fountain' durch die bogig nach unten aus dem Hauptstamm wachsenden Äste	<b>1j.Vg</b> <b>3j.Vg</b>	<b>15- 30</b> <b>60-100</b>	<b>P1</b> <b>C2</b>
<b>Fagus sylvatica 'Brathay Purple'</b> rotblättrige Variante von 'Cristata'	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Fagus sylvatica 'Cristata'</b> schlanker bizarrer Wuchs mit hahnenkamm ähnlichen Blättern, die an den Triebspitzen knäuelartig sind	<b>3j.Vg</b> <b>3j.Vg</b>	<b>30- 50</b> <b>60-100</b>	<b>P1</b> <b>C2</b>
<b>Fagus sylvatica 'Dawyck'</b> Säulenbuche, schmalkegelförmiger Wuchs	<b>2j.Vg</b> <b>3j.Vg</b>	<b>30- 50</b> <b>60-100</b>	<b>P1</b> <b>C2</b>
<b>Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'</b> schlank säulenförmiger Wuchs, junge Blätter gelb, später gelbgrün	<b>1j.Vg</b> <b>3j.Vg</b>	<b>15- 30</b> <b>60-100</b>	<b>P1</b> <b>C2</b>

<b>Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'</b> schlank säulenförmiger Wuchs, Blätter purpurrot, Sorte für kleine Gärten	2j.Vg	40- 60	P1
<b>Fagus sylvatica 'Franken'</b> dichter breitaufrechter Wuchs, im Austrieb cremefarben, danach vergrünend mit hellgelber Zeichnung	1j.Vg	15- 20	P1
<b>Fagus sylvatica 'Interrupta'</b> Blattspreite, besonders beim Johannistrieb, unregelmäßig unterbrochen und eingeschlitzt oft fehlen ganze Blatteile, verformte, schiefe Blätter sind ebenfalls vorhanden	2j.Vg	20- 30	P1
<b>Fagus sylvatica 'Long Red'</b> dunkelrote Blätter, im Nervenbereich etwas heller, glatter Rand	1j.Vg	15- 30	P1
<b>Fagus sylvatica 'Mercedes'</b> Blätter wie bei 'Asplenifolia', aber schwächer im Wuchs , dicht verzweigt Herbstlaub leuchtend gelb	1j.Vg 3j.Vg	15- 20 30- 50	P0,5 C2
<b>Fagus sylvatica 'Purple Fountain'</b> straff bis zum Boden hängende Zweige mit tiefroten Blättern, der Mitteltrieb wächst dagegen aufrecht	1j.Vg	15- 30	P0,5
<b>Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'</b> dichter säulenförmiger Wuchs, Blätter stark gebuchtet und gewellt, Austrieb hellrot, dann rotbraun, Herbstfärbung braun	1j.Vg 3j.Vg	15- 30 30- 50	P1 C2
<b>Fagus sylvatica 'Sandrode'</b> aufrechter, dicht verzweigter Wuchs, grüne Blätter leicht gewellt, Herbstfärbung gelbbraun	1j.Vg 2j.Vg	15- 20 20- 40	P1 P1
<b>Gleditsia triacanthos 'Rubylace'</b> junge Blätter dunkelrot, später bronzegrün, breitaufrechter Wuchs, dornenlos	1j.Vg	30- 50	P1
<b>Gleditsia triacanthos 'Sunburst'</b> junge Blätter goldgelb, später vergrünend, breit kegelförmiger Wuchs, dornenlos	1j.Vg	30- 50	P1
<b>Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise'</b> tief schwefelgelbe Blüten, schon als junge Pflanze reich blühend, lange, späte Blütezeit, Wuchs trichterförmig	1j.Vg	20- 40	P0,5
<b>Hamamelis x intermedia 'Barmstedt Gold'</b> intensiv goldgelbe Blüten, leicht duftend, Wuchs stark aufrecht	1j.Vg	20- 40	P0,5
<b>Hamamelis x intermedia 'Diane'</b> große, bronzerote Blüten, schwach duftend, Wuchs breit aufrecht	1j.Vg	20- 40	P0,5
<b>Hamamelis intermedia 'Feuerzauber'</b> rote Blüten, leicht duftend, mittelfrüh, breit aufrechter Wuchs	1j.Vg	20- 40	P0,5
<b>Hamamelis x intermedia 'Jelena'</b> große, orange Blüten mit gelbem Rand, Wuchs breit trichterförmig	1j.Vg	20- 40	P0,5
<b>Heptacodium miconioides</b> strauchartiger Wuchs, schwach duftend weiße Blüten in Rispen von August bis Oktober, Früchte purpur bis leuchtend rot, auffällig abfasernde Rinde	3j.	15- 30 15- 30	P0,5 P1
<b>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</b> sehr große, rahmweiße Schneeballblüten	3j.		P0,5

<b>Hydrangea aspera 'Macrophylla'</b> Samthortensie, bläulich lila Tellerblüten im Sommer, bildet keine Ausläufer	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b>	<b>P1</b>
<b>Hydrangea paniculata 'Dharuma'</b> niedriger, kompakter schwacher Wuchs, Blüte ab Juni, beim Abblühen dunkelrosa, Triebe braunrot	<b>3j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
<b>Hydrangea quercifolia</b> eichenblättrige Hortensie mit großen Blättern, die meist tief 5-lappig sind und sich im Herbst purpurrot färben, weiße Rispenblüten, die bis zu 20 cm lang und bis 15 cm breit werden im Juli bis August,	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Hydrangea quercifolia 'Harmony'</b> besonders hohe und breite Blüten		<b>20- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Hydrangea quercifolia 'Snowflake'</b> Form der eichenblättrigen Hortensie mit großen Blättern, die meist tief 5-lappig sind und sich im Herbst schön purpurrot färben, weiße Rispenblüten, die bis zu 20 cm lang und bis 15 cm breit werden im Juli bis August, im Verblühen werden die sterilen Blüten rosa	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Ilex crenata 'Glory Gem'</b> sehr dichter, tellerförmiger schwacher Wuchs, Triebe gut verzweigt, Blätter klein, glänzend, frischgrün bis dunkelgrün, männliche Form	<b>3j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
<b>Ilex crenata 'Green Lustre'</b> Wuchsform sehr dicht , fast kugelig, gut verzweigte Triebe, großes, mittelgrünes, flaches bis konkaves schwach glänzendes Blatt, mittelstark wachsend, stark fruchtend	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b>	<b>P0,5</b>
<b>Ilex crenata 'Twiggy'</b> kompakter, dicht kugeliger Wuchs, hellgrünes, feines Blatt, Austrieb zart gelb, schwarzen Beeren	<b>3j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
<b>Ilex meserveae 'Little Rascal'</b> Wuchs dichtkugelig kompakt, Laub im Austrieb frischgrün, später dunkelgrün, im Winter dunkelviolet, kein Beerenansatz	<b>2j.</b> <b>3j.</b>	<b>8- 12</b> <b>15- 20</b>	<b>P0,5</b> <b>P0,5</b>
<b>Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'</b> Säulenform des Blasenbaumes, Blätter gefiedert, bis 35 cm lang, gelbe Herbstfärbung, gelbe Blüte in Rispen von Juli bis August	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Ligustrum ovalifolium 'Aureum'</b> breite Blätter mit goldgelbem Rand, wintergrün	<b>2j.</b>	<b>15- 30</b> <b>20- 40</b>	<b>P0,5</b> <b>P1,3</b>
<b>Liquidambar orientalis 'M. Foster'</b> strauch- bis baumartiger Wuchs, Blätter 5lappig und tief gebuchtet mit toller Herbstfärbung	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Liquidambar styraciflua 'Autumn Color Globe'</b> kugeliger kompakter Wuchs , rote Herbstfärbung	<b>2j.Vg</b>	<b>50- 80</b>	<b>P1</b>
<b>Liquidambar styraciflua 'Oconee'</b> schwachwüchsiger, kugeliger, starkverzweigter Wuchs, purpurrote Herbstfärbung	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'</b> säulenförmiger Wuchs mit schöner Herbstfärbung	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Liquidambar styraciflua 'Stared' (Syn. 'Stella')</b> tief eingeschnittenes Laub, dunkelrote Herbstfärbung, Wuchs kegelförmig	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>

<b>Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'</b> erst schmal kegelförmiger, später mehr breit pyramidaler Wuchs, tief eingeschnittene Blätter, Herbstfärbung orange bis weinrot	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Liriodendron tulipifera</b> ungewöhnliche Blattform, die im Umriss fast viereckig ist, prachtvoll goldgelbe Herbstfärbung	<b>3j.</b>	<b>80-120</b>	<b>P0,5</b>
<b>Lonicera purpusii</b> stark duftende, rahmweiße Blüten von Dezember bis April, Früchte rot	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Magnolia x brooklynensis 'Woodsmann'</b> tulpenförmige Blüten, fast bläulich-rosa mit gelben und grünen Untertönen ab Mai, Großstrauch	<b>1j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Magnolia 'Charles Coates'</b> das im Halbschatten bis 30 cm lang sein kann	<b>2j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Magnolia 'Galaxy'</b> leuchtend rosa Blüten, starker aufrechter Wuchs mit Leittriebbildung	<b>1j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Magnolia 'Gold Star'</b> gelbe sternförmige Blüten vor dem Laubaustrieb, Austrieb bronzefarben, Wuchs gut verzweigt	<b>1j.Vg.</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Magnolia liliiflora 'Betty'</b> kompakter Wuchs, Blüten außen purpurrot, innen weiß	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Magnolia liliiflora 'Nigra'</b> Blüten außen dunkelpurpurn, innen etwas heller, regelmäßige Nachblüte	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Magnolia liliiflora 'Ricki'</b> Blüten mit gedrehten Petalen, innen rosigweiß, außen weinrot	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Magnolia liliiflora 'Susan'</b> purpurrote Blüten, gute Nachblüte im Sommer, kompakter Wuchs	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b> <b>20- 30</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Magnolia soulangeana</b> Großstrauch, weiße Blüten mit rosa Basis, oft Nachblüte im Spätsommer	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Magnolia stellata 'Georg Henry Kern'</b> kompakter, langsamer Wuchs, sternförmige, rosa, zur Blütenspitze weißliche Blüten	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Magnolia soulangeana 'Lenei'</b> große, glockenförmige Blüten, an der Basis purpurfarben und auf der Innenseite rosa bis weiß	<b>1j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Magnolia 'Yellow Bird'</b> becherförmige, rein gelbe Blüten mit dem ersten Blattaustrieb ab Mai, lockerer aufrechter Wuchs	<b>1j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
<b>Malus 'Golden Hornet'</b> reinweiße Blüten, zahlreiche goldgelbe Früchte, haften sehr lange	<b>3j.Vg</b>	<b>80-120</b>	<b>P1</b>
<b>Malus 'Indian Magic'</b> Blüte dunkelviolet, in der Knospe braunviolet, orangerote längliche Früchte, schöne rote Herbstfärbung	<b>2j.Vg</b> <b>3j.Vg</b>	<b>30- 50</b> <b>80-120</b>	<b>P1</b> <b>P1</b>
<b>Malus 'Makamik'</b> kleiner Baum mit langer, runder Krone, im Austrieb rötlich, später bronzegrün, Blüte zuerst dunkelrot, dann purpurrosa, reich blühend, Früchte hellrot, auf der Schattenseite mehr orange	<b>3j.Vg</b>	<b>80-120</b>	<b>P1</b>

<b>Malus 'Prairiefire'</b>	<b>2j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
aufrechter bis rundkroniger Baum, Blätter anfangs purpurrot, später dunkelgrün Blüte purpurrosa, Früchte tief purpurrot	<b>3j.Vg</b>	<b>80-120</b>	<b>P1</b>
<b>Malus pumila 'Niedzwetzkyana'</b>	<b>3j.Vg</b>	<b>80-120</b>	<b>P1</b>
roter Austrieb, später vergrünende Blätter, purpurrote Blüten, reich fruchtend, große rote Früchte mit rotem Fruchtfleisch			
<b>Malus 'Red Sentinal'</b>	<b>2j.Vg</b>	<b>50- 80</b>	<b>P1</b>
großer Strauch mit überhängenden Seitenästen, weiße Blüten, lang haftende kirschrote Früchte rotgrün, aufrechter Wuchs			
<b>Malus toringo 'Scarlett'</b>	<b>3j.Vg</b>	<b>50- 80</b>	<b>P1</b>
kräftig rosa Blüte, lang haftende rötliche Früchte, Laub erst purpurrot, später rotgrün, aufrechter Wuchs			
<b>Malus toringo 'Tina'</b>	<b>2j.Vg</b>	<b>20- 30</b>	<b>P1</b>
schwach wachsende Art, besonders reich blühend mit roter Knospe und weißen Blüten	<b>3j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Malus 'Van Eseltine'</b>	<b>2j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
fast säulenförmiger Wuchs, Blüte kräftig rosa, Früchte gelb mit zum Teil großer roter Backe			
<b>Parrotiopsis jacquemontiana</b>	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P0,5</b>
die Scheinparrottie ist ein Strauch mit anfangs sternhaarigen, später kahlen Blättern, Blüte mit gelben Köpfchen von weißen Hochblättern umgeben, duftend, bis 4 cm groß von März bis Mai			
<b>Pieris japonica 'Bonfire'</b>	<b>2j.</b>	<b>8- 12</b>	<b>P0,5</b>
Wuchs breitaufrecht, Belaubung frischgrün glänzend, Blüten aufrecht, im knospigen Stadium purpurrot, später rosaweiß			
<b>Pieris japonica 'Little Heath'</b>	<b>2j.</b>	<b>8- 12</b>	<b>P0,5</b>
dichter Wuchs, Austrieb rosa, kleine weißbunte Blätter			
<b>Pieris japonica 'Mountain Fire'</b>	<b>2j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
gedrungener Wuchs, Austrieb bronzelachsot, weiße Blüten			
<b>Pieris japonica 'Red Mill'</b>	<b>2j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
aufrechter, breitbuschiger Wuchs, karminroter Austrieb, weiße Blüte			
<b>Pieris japonica 'Valley Valentine'</b>	<b>2j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
überhängende, dunkelgrüne Belaubung, Blüte tiefrot			
<b>Pieris japonica 'White Rim' (Syn. 'Variegata')</b>	<b>3j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
weißbuntes Laub, langsamer, dichter Wuchs			
<b>Prunus cerasifera 'Nigra'</b>	<b>1j.Vg</b>	<b>80-120</b>	<b>P1</b>
Großstrauch mit dunkelrotem Laub, einfache, rosa Blüte			
<b>Prunus incisa 'Kojou-no-mai'</b>	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 20</b>	<b>P1</b>
dicht verzweigter aufrechter langsamer Wuchs mit gedrehten Treiben, Blüten in der Knospe rosarot, später rosa bis rosaweiß im März bis April			
<b>Prunus kurilensis 'Brillant'</b>	<b>1j.Vg</b>	<b>20- 40</b>	<b>P1</b>
schwachwüchsig, Knospen rosa, Blüte weiß, als junge Pflanze schon blühend			



<b>Prunus laurocerasus 'Cherry Brandy'</b> Wuchs breiter als hoch, dicht verzweigt, sehr stark wachsend, Blatt mittel- bis dunkelgrün, glänzend, im Austrieb bronzefarben	3j.	15- 30	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Herbergii'</b> breit aufrechter Wuchs, schmal-elliptische Blätter	3j.	15- 30	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Mano'</b> breit und dicht verzweigter Wuchs, dunkelgrüne, leicht glänzende Blätter, sehr winterhart	3j.	15- 30	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'</b> Wuchs flach ausgebreitet, sehr langsam, großes, glänzend grünes Laub	3j.	10- 15	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'</b> breit buschig, gedrungener Wuchs, schmales, kleines Laub	3j.	15- 30	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Piri'</b> dichter, kompakter, schwacher Wuchs, genauso breit wie hoch, länglichrundes, dunkelgrünes Laub	3j.	10- 15	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla'</b> breit aufrecht wachsend, große, dunkelgrüne Blätter	3j.	15- 30	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Van Nes'</b> breitaufrechter Wuchs, gesundes dunkelgrünes Laub, gut winterhart	3j.	15- 30	P0,5
<b>Prunus laurocerasus 'Zabeliana'</b> breite flache Wuchsform, sehr schmales glänzendes, mittelgrünes Blatt	3j..	15- 30	P0,5
<b>Prunus lusitanica 'Angustifolia'</b> kompakter im Wuchs als die Art, immergrün, Blätter kleiner und schmaler, weiße Traubenblüte im Juni, dunkelrote Früchte	3j.	20- 30	P0,5
<b>Prunus serrulata 'Amanogawa'</b> Säulen-Zierkirsche, gefüllte, hellrosa Blüten	1j.Vg	30- 50	P1
<b>Prunus serrulata 'Kanzan'</b> breit trichterförmiger Wuchs, rosa, gefüllte Blüten	1j.Vg 3j.Vg	30- 50 30- 50	P1 P1
<b>Prunus serrulata 'Royal Burgundy'</b> Wuchs etwas schwächer als bei 'Kanzan', Blätter tief violett-purpurrot, Blüten dunkelrosa	2j.Vg	30- 50	P1
<b>Prunus tenella 'Fire Hill'</b> niedriger, straff aufrecht wachsender Strauch, zahlreiche, hellrote Blüten	1j.Vg	30- 50	P1
<b>Quercus palustris 'Green Dwarf'</b> kugelförmige, dichte Krone, Blätter im Austrieb rötlich		15- 30 30- 40	P1 C2
	Sth 40-50 Sth 40-60 Sth 40-50	2j.Vg 3j.Vg	P1 C2 C3
<b>Quercus robur 'Fastigiata Koster'</b> straff säulenförmiger, aufrechter Wuchs,		40- 60	C2
<b>Robinia hispida 'Macrophylla'</b> locker und sparrig verzweigter Strauch mit purpurfarbenen oder rosa Blüten im Mai/Juni	1j.Vg 2j.Vg	80-120 30- 50	P1 P1



<b>Sorbus 'Chinese Lace'</b> säulenformiger Wuchs mit gesundem tief eingeschnittenem Laub, weiße Blüte im Mai, Früchte orangerot, gelbrote Herbstfärbung Bienennährpflanze, wertvoller Baum für Schmetterlinge und Falter, Nährbaum für Vögel	<b>2j.Vg</b>	<b>50- 80</b>	<b>P1</b>
<b>Sorbus 'Joseph Rock'</b> kleiner kompakt wachsender Baum, dessen Blätter sich im Herbst herrlich verfärben, die bis in den Winter haltenden Früchte sind gelb	<b>1j.Vg</b> <b>2j.Vg</b>	<b>50- 80</b> <b>50- 80</b>	<b>P1</b> <b>P1</b>
<b>Sorbus sargentiana</b> langsamwüchsiger, breit säulenförmiger Wuchs, in der Jugend wenig verzweigt, große Blätter, im Herbst kräftig rot, kleine rote Früchte in großen Köpfen, große dunkelrote, klebrige Winterknospen	<b>2j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Sorbus 'Ulong'</b> schlanker aufrechter Wuchs, orange-rote Herbstfärbung, große knallrote Früchte	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Sorbus 'Wifrid Fox' (Syn. wilfordiana)</b> in der Jugend breit säulenförmig, später rundkronig, große ovale Blätter, unterseite filzig, oben grau-grün mit schöner Nervatur, Früchte groß, kugelig, zuerst grün, dann bernsteingelb mit grauen Flecken	<b>1j.Vg</b>	<b>20- 30</b>	<b>P1</b>
<b>x Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze'</b> Kreuzung zwischen Parrotia und Sycopsis, wintergrüner Strauch mit Frühjahr rotem Austrieb, schöne Herbstfärbung, Wuchs schmaler als Parrotia	<b>1j.Vg</b> <b>2j.Vg</b>	<b>30- 50</b> <b>40- 60</b> <b>80-120</b>	<b>P0,5</b> <b>C2</b> <b>C3</b>
<b>Syringa afghanica</b> dünn verzweigter, trocken resistenter Strauch bis 1 m hoch, Blätter fiederschnittig, Blüte blaulila in schlanken Rispen	<b>3j.</b>	<b>10- 15</b>	<b>P0,5</b>
<b>Syringa 'Minuet'</b> bis 1,8 m hoch, schwachwüchsig, dicht verzweigt, breitbuschig, bis 25 cm lange, hellviolette, schlanke Blütenrispen Mitte Juni	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b> <b>30- 50</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Syringa patula 'Miss Kim'</b> aufrechter, dichtbuschiger Strauch, duftende violett-rosa Blüten in langen Rispen	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b> <b>15- 20</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Syringa vulgaris in Sorten</b> 'Charles Joly' (purpurrot gefüllt) 'Madame Lemoine' (rein-weiß gefüllt) 'Katherina Havemeyer' (lila mit rosa Anflug) 'Primrose' (gelbliche Knospen, cremegelb,einfach)	<b>2j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Ulmus parvifolia 'Seiju'</b> locker aufrecht bis breite, langsam wachsende Zwergform, dichte Fischgräten ähnliche Stellung der Seitenzweige, Blätter sattgrün	<b>1j.Vg</b>	<b>30- 50</b>	<b>P1</b>
<b>Ulmus x hollandica 'Wredei'</b> schmaler, kegelförmiger Wuchs, im Alter breiter werdend, goldgelbe Blätter	<b>3j.Vg</b>	<b>50- 80</b>	<b>P1</b>
<b>Vaccinium corymbosum 'Berkeley'</b> mittelgroße bis große, hellblau bereifte Beeren, mittlere Reifezeit		<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'</b> große, leuchtendblaue, mittelfrühe Beeren, geeignet für trockene Standorte		<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Vaccinium corymbosum 'Brigitta Blue'</b> mittelgroße hellblaue Beeren, sehr gut lager- und transportfähig, mittlere Reifezeit		<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>

<b>Vaccinium corymbosum 'Goldtraube'</b> große, hellblaue, späte Beeren		<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Vaccinium corymbosum 'Hardyblue'</b> mittelgroße bis große, dunkelblaue Beeren, mittlere Reifezeit, toleriert auch extreme Standorte		<b>20- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Viburnum x bodnantense 'Dawn'</b> Winterschneeball, tiefrosa Knospen, rosaweiße Blüten im November/Dezember und März	<b>3j.</b> <b>3j.</b>	<b>20- 30</b> <b>15- 20</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Viburnum x carlcephalum</b> Blüten in großen Trugdolden, zuerst rosa, aufblühend weiß	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Viburnum x burkwoodii</b> wintergrüne Art, stark duftende Blüten, in der Knospe rosa, später weiß	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b> <b>20- 30</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Viburnum x burkwoodii 'Conoy'</b> wintergrüner kompakter, breitbuschiger und langsam wachsender Strauch, in der Knospe rosa, ballförmige weiße Trugdolden	<b>1j.Vg</b> <b>2j.Vg</b>	<b>15- 20</b> <b>20- 30</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Viburnum x burkwoodii 'Anne Russell'</b> aufrechter und nicht so locker wachend wie die Art mit großen, kugelförmigen Blütenständen, Blütenknospen rosa, duftend weiße Blüten	<b>1j.Vg</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Viburnum carlesii 'Aurora'</b> langsam wachsend, Blüte in der Knospe rot, rosa aufblühend, später weiß, stark duftend	<b>1j.Vg</b> <b>2j.Vg</b> <b>3j.Vg</b>	<b>15- 30</b> <b>20- 30</b> <b>30- 50</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b> <b>P1</b>
<b>Viburnum davidii</b> immergrüner Teppichschneeball, weiße Blüten, blauschwarze Früchte	<b>2j.</b> <b>3j.</b>	<b>10- 15</b> <b>10- 15</b>	<b>P0,5</b> <b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Viburnum 'Eskimo'</b> wintergrüner Strauch mit langsamem, kompaktem Wuchs, Knospen cremefarben bis rosa, Blüte reinweiß	<b>1j.Vg</b> <b>2j.Vg</b>	<b>15- 20</b> <b>20- 30</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Viburnum farreri 'Nanum'</b> kompakter, straff aufrechter, dicht verzweigter Wuchs, Knospen rosafarben, weiße, süßlich duftende Blüten vor dem Laubaustrieb, bis ca. 100 cm hoch	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
<b>Viburnum nudum 'Pink Beauty'</b> Kleinstrauch mit länglichen Blättern, holunderartige weiße Blüte im Sommer, Beeren bläulich, lange haltend, Herbstfärbung intensiv rötlich	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b>	<b>P0,5</b>
<b>Viburnum plicatum 'Mariesii'</b> mittel hoher Strauch, etagenförmiger breit ausladender Wuchs, reinweiße Blüten bedecken den ganzen Strauch, rote Herbstfärbung	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Viburnum plicatum 'Newport'</b> dicht verzweigter rundlicher Wuchs, rundliche sterile weiße Blüten	<b>3j.</b> <b>3j.</b>	<b>10- 15</b> <b>10- 15</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>
<b>Viburnum plicatum 'Pink Beauty'</b> breitrunder, waagrecht wachsender Strauch, Blüte rosa-weiß, rote Früchte	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'</b> aufrecht wachsender Strauch, reinweiße Blüten vom Frühjahr bis zum Herbst	<b>3j.</b> <b>3j.</b>	<b>15- 20</b> <b>15- 20</b>	<b>P0,5</b> <b>P1</b>

<b>Viburnum plicatum tomentosum</b>	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
hoher, breitwüchsiger Strauch, reinweiße Blütendolden, weinrote Herbstfärbung	<b>3j.</b>	<b>20- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Viburnum x rhytidophylloides 'Willowwood'</b>	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b>	<b>P0,5</b>
wird nicht so hoch im Wuchs wie die Art, Blätter nicht so runzelig	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P1</b>
<b>Viburnum sargentii 'Onondaga'</b>	<b>3j.</b>	<b>15- 30</b>	<b>P0,5</b>
bis 1,8 m hoher Strauch mit dreilappigen, in der Jugend kastanienbraunen, später braun-grünen Blättern, rote Knospen, Blüte rahmweiß bis blassrosa Ende Mai-Anfang Juni		<b>15- 20</b>	<b>P1</b>
<b>Viburnum subalpinum</b>			
starker Nervatur der Blätter und roten Blattstielen, Blüte im Mai–Juni mit weißen, leicht hängenden Blüten,	<b>3j.</b>	<b>15- 20</b>	<b>P0,5</b>
		<b>15- 20</b>	<b>P1</b>